

**Ri (Serum)**

Stand: 31.07.2017

**Synonyme**

ANNA-2

**Methode**ANNA-Blot, Hand, [DL\\_1111-4G\\_A\\_DE\\_C04.pdf](#)**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

**Beschreibung**

Qualitative Bestimmung von Autoantikörpern gegen Ri. Ri-Ak werden auch ANNA-2 (anti-neuronale nukleäre Antikörper Typ 2) genannt. Sie werden beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom gefunden. Sie sind mit dem kleinzelligen Bronchialkarzinom und dem Mammakarzinom assoziiert. Beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom treten unregelmäßige, unkontrollierte Bewegungen von Augen (Opsoklonus) und Gliedern (Myoklonus) auf.

**Indikation**

Verdacht auf paraneoplastisches neurologisches Syndrom (PNS), z.B. bei Patienten mit unklarer Störung der Okulomotorik.

**Abrechnungsinformation**

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3864	300 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 17.49 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

1x/1-2 Wochen