Aripiprazol (LC/MS)

Einheit: µg/l

Stand: 20.03.2023

Methode

LC-MS, LC-MS, [92028-xt_lot0923_3plus1_neuroleptics_1-xt_calibrator_set.pdf](#),
[92912_XT_Series_A_neuroleptics_1_XT_serum_plasma_DE_1.0_IVDR_WS.pdf](#)

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		100-350 (B)

(A) Zielbereich (B) Therapeutischer Bereich

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Aripiprazol wirkt als Neuroleptikum blockierend auf die Dopaminbindungsstelle und wird eingesetzt zur Behandlung bei akuten und chronisch schizophrenen Störungen. Bei Leber- bzw. Niereninsuffizienz ist eine Dosisreduktion notwendig.

Probenabnahme:

Talspiegel: unmittelbar vor der nächsten Dosis

Bergspiegel: 3 – 5 Stunden nach Gabe

Steady-State: nach ca. 4 – 5 Tagen h bei Langzeitbehandlung

Eliminations-Halbwertszeit: Erwachsene: 75 Stunden

Indikation

Therapeutisches Drug-Monitoring

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4078	570 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 33.22 Euro
GOAE	4079	350 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 20.40 Euro
EBM	32314	51.90 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)