

Haloperidol (LC/MS)

Einheit: µg/l

Stand: 20.03.2023

Methode

LC-MS, LC-MS, [92028-xt_lot0923_3plus1_neuroleptics_1-xt_calibrator_set.pdf](#),
[92912_XT_Series_A_neuroleptics_1_XT_serum_plasma_DE_1.0_IVDR_WS.pdf](#)

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		1-10 (B)

(A) Zielbereich (B) Therapeutischer Bereich

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Probenabnahme:

Talspiegel: unmittelbar vor der nächsten Dosis

Bergspiegel: 2-3 Stunden nach Gabe

Eliminations-Halbwertszeit: Erwachsene 12-36 Stunden

Indikation

Therapeutisches Drug-Monitoring

Spezielle Hinweise

Haloperidol wird als Neuroleptikum eingesetzt zur akuten Behandlung bei schizophrenen Störungen oder Manien und wirkt über eine Blockade der Bindungsstelle für Dopamin. Durch die Hemmung der Dopaminwirkung werden Erregungszustände verringert; gleichzeitig aber auch extrapyramidal-motorische Nebenwirkungen getriggert. Bei Leber- bzw. Niereninsuffizienz ist eine Dosisreduktion notwendig.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4078	570 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 33.22 Euro
GOAE	4079	350 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 20.40 Euro
EBM	32314	51.90 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)