

IgA (Serum/Neuro)

Einheit: mg/dl

Stand: 20.03.2023

MethodeImmunolog. Trübungstest, COBAS, [C.f.a.s. IgA IgM CSF_202107.pdf](#), [IGA_CSF_202211.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
	1 Jahr	< 14 mg/dl
	3 Jahr	< 80 mg/dl
	6 Jahr	11-142 mg/dl
	14 Jahr	34-220 mg/dl
	19 Jahr	40-293 mg/dl
		70-400 mg/dl

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Zur Ermittlung des Liquor/Serum-Quotienten. Der IgA-Quotient dient in Verbindung mit dem Liquor/Serum-Quotienten des Albumins zur halbquantitativen Erfassung von autochthon gebildetem IgA im Liquor, neben dem über die Blut/Liquor-Schranke filtrierten. Beide Quotienten werden zur IgA-Indexberechnung und im Albumin/IgA-Quotientenschema nach Reiber verwendet.

Indikation

Durch die gleichzeitige Bestimmung von IgA und Albumin in Liquor/Serum-Paaren ist eine Differenzierung zwischen aus Blut stammendem IgA und IgA aus intrathekalen Produktion möglich.

Die Ergebnisse des Liquor/Serum-Quotienten für IgA und Albumin in Verbindung mit dem Quotientendiagramm nach Reiber unterstützen die Diagnose von Funktionsstörungen der Blut-Hirn-Schranke und/oder intrathekalen IgA-Synthese.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3571	150 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 8.74 Euro
EBM	32103	0.60 Euro

Bearbeitung

täglich (24/7)