

Yo (Serum)

Stand: 09.12.2016

MethodeIIFT, Hand, [Neurologie_Mosaik_4.3.2019.pdf](#)**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Qualitative Bestimmung von Autoantikörpern gegen Yo. Yo-Ak werden auch PCA-1 (Purkinje-Zell-Antikörper Typ 1) genannt und richten sich gegen das CDR62-Antigen, das im Kleinhirn und Hirnstamm exprimiert wird. Das sogenannte „Yo-Syndrom“ ist eine paraneoplastische zerebelläre Degeneration, welches häufig 3-4 Jahre vor dem Tumornachweis auftritt. Dieser Antikörper wird überwiegend bei Frauen gefunden, da er assoziiert ist mit Ovarial-, Mamma- und Uteruskarzinomen.

Indikation

V.a. paraneoplastische neurologische Syndrome

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3827.H2	290 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 16.90 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

1x/1-2 Wochen