

Leichtketten, Kappa (Urin)

Stand: 20.03.2023

Einheit: mg/l

Methode

Nephelometrie, BN-II, [N_Antisera_to_Human_Immunoglobulin_L-chains_2021_08.pdf](#),
[N_Protein_Standard_SI_-_Rev_10_DXDCM_09017fe98085e91b-1705312524911.pdf](#)

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		0-7.1 mg/l

Material

Urin Monovette, 10 ml, gelb

Beschreibung

Probenmaterial: Zweiter morgendlicher Spontanurin (ist dem 24 h Sammelurin bei ambulanten Patienten gleichwertig, wenn der Bezug auf die Kreatinin-Ausscheidung erfolgt) bzw. 24 h Sammelurin.

Indikation

Nachweis von Bence-Jones-Proteinen im Urin

Spezielle Hinweise

Normalerweise treten kappa und lambda Leichtketten in einem festen Verhältnis zueinander auf. Hinweise auf das Auftreten von monoklonalen Leichtketten ergeben sich aus Abweichung dieses Verhältnisses.

Normal beträgt der k/l Quotient im Urin 0,75 - 4,5. Liegen niedrigere oder höhere Quotientenwerte vor, besteht Verdacht auf Monoklonalität.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3741	200 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 11.66 Euro
EBM	32446	12.60 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)