

Leichtketten, Lambda (Serum)

Stand: 20.03.2023

Einheit: mg/dl

Methode

Nephelometrie, BN-II, [N_Antisera_to_Human_IgG_monoclonal_L-chains_2021_08.pdf](#),
[N_Protein_Standard_SI_-_Rev_10_DXDCM_09017fe98085e91b-1705312524911.pdf](#)

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		90-210 mg/dl

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Es werden gebundene und freie L-Ketten vom Typ kappa und vom Typ lambda quantitativ gemessen. Das Verhältnis der Konzentrationen von k und l beträgt i.d.R. ca. 2:1. Wenn das Verhältnis sehr stark hiervon abweicht, kann Monoklonalität vorliegen.

Indikation

monoklonale Gammopathie.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3571	150 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 8.74 Euro
EBM	32447	12.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)