Prä-Albumin (Serum)

Stand: 20.03.2023

Einheit: mg/dl

MethodeNephelometrie, BN-II, [N_Antiserum_gegen_Human-Praealbumin.pdf](#), [N_Protein_Standard_SL - Rev 10_DXDCM_09017fe98085e91b-1705312524911.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		20-40 mg/dl

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Präalbumin ist ein Transportprotein, das in der Serumeiweißelektrophorese vor der Albuminfraktion wandert. Präalbumin transportiert Thyroxin und Vitamin A. Präalbumin und Transferrin zeigen als Proteingruppe ein charakteristisch gegensinniges Verhalten zu den Akute-Phase-Proteinen, bei allen akuten und chronischen Entzündungszuständen im Sinne einer Verminderung und werden als Anti-Akute-Phase-Proteine bezeichnet. Aufgrund der kurzen Halbwertszeit des Präalbumins von 2 Tagen kommt es bei akuter Leberzellschädigung sehr rasch zu einer Verminderung der Serumkonzentration. Erhöhte Serumkonzentrationen treten bei Corticoidmedikation und Einnahme von oralen Kontrazeptiva auf.

Indikation

Beurteilung der Leberfunktion.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3759	180 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 10.49 Euro
EBM	32455	8.90 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)