

Risperidon (LC/MS)

Stand: 20.03.2023

Einheit: µg/l

Methode

LC-MS, LC-MS, [92028-xt_lot0923_3plus1_neuroleptics_1-xt_calibrator_set.pdf](#),
[92912_XT_Series_A_neuroleptics_1_XT_serum_plasma_DE_1.0_IVDR_WS.pdf](#)

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Probenabnahme:

Talspiegel: unmittelbar vor der nächsten Dosis

Bergspiegel: 1 – 2 Stunden nach Gabe

Steady-State: nach ca. 1 Tag

Eliminations-Halbwertszeit: Erwachsene: 3 Stunden

Indikation

Therapeutisches Drug-Monitoring

Spezielle Hinweise

Risperidon wird eingesetzt zur Behandlung bei akuten und chronisch schizophrenen Störungen. Es gehört zur Gruppe der atypischen Neuroleptika und wirkt über eine Blockade der Bindungsstelle für Dopamin und Serotonin. Bei Leber- bzw. Niereninsuffizienz ist eine Dosisreduktion notwendig.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4078	570 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 33.22 Euro
GOAE	4079	350 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 20.40 Euro
EBM	32314	51.90 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)